

quinque punctorum alborum. Alae albae costae fasciaeque, marginem tenuiorem haud attingente nigris.

STOMOXYS. *Haustellum* vagina uniuersa, conuoluta, basi geniculata ferisque duabus vaginantibus.

Antennae setariae.

bombylans. 5—6. S. pilosa cinerea, abdomine pallido: fasciis tribus atris.

Habitat — — Mus. Dom. Bosc.

Magna in hoc genere. *Antennae* incumbentes, crassiores, ferrugineae. Caput pallidum atomis ferrugineis. Thorax pilosus, griseus, immaculatus. Abdomen valde pilosum fasciis tribus nigris: posteriore maiore. Alae obscurae, basi ferrugineae. Pedes ferruginei.

EMPIS. Os haustello et proboscide inflexis.

Haustellum vagina uniuersa.

Palpi breues, filiformes.

Antennae setariae.

femorata. 10—11. E. nudiuscula cinerea thorace lineato, femoribus posticis incrassatis nigris apice testaceis.

Habitat Parisiis Dom. Bosc.

Statura et magnitudo praecedentium. Caput paruum obscurum rostro testaceo. Thorax cinereus, lineatus. Abdomen mox magis cinereum, mox magis obscurum pube maris exserto, reflexo, compresso. Alae albae, immaculae. Pedes ferruginei femoribus posticis incrassatis, nigris, apice testaceis.

BOMBYLIUS. *Haustellum* longissimum, rectum, setaceum, bivalve.

Palpi duo pilosi.

Antennae subulatae, basi connatae.

2—3. B. alis dimidiato nigris aequalibus hirtus *micans*.
 albus, thorace lineis tribus fuscis micantibus.

Habitat in Africa Dom. Dymiril.

Paullo maior B. medio. Corpus totum hirsutissimum, album thoracis dorso lineis tribus latis, fuscis, micantibus. Alae albae, dimidiato fuscae et in hac parte lineola parva basios alba. Pedes testacei.

3—4. B. alis punctatis basi fuscis, antennis *complanicornis*.
 presso acuminatis.

Habitat in Germania.

Corpus medium, hirtum. Rostrum porrectum, nigrum. Antennae ultimo articulo valde compresso, acuminato. Thorax flavescentis, postice fuscus. Abdomen fuscum punctis duobus posticis albis. Alae fusco punctatae basique fuscae.

3—4. B. alis albis basi fuscis hirtus cinereus *ab-cruciatus*.
 domine cruce niuea, antennis acuminatis.

Habitat Monspeliae Mus. Dom. Bose.

Statura praecedentium. Antennae approximatae, nigrae: articulo ultimo cylindrico apice acumine subulato. Rostrum longitudine corporis. Thorax hirtus, cinereus, antice pilis aliquot rufis. Alae albae, basi fuscescentes. Abdomen hirtum, cinereum postice linea dorsali strigisque duabus albis. Pedes obscuri.

VOLUCCELLA. *Haustellum* elongatum,
rectum, bivalue.

Palpi nulli.

Antennae approxima-
tae: articulo ultimo
crassiori, cylindrico.

atrata,

1—2. V. villosa atra alis albis immaculatis.

Habitat in Marocco Dom. Schousboe.

Corpus praecedente multo minus, totum pi-
losum, atrum, immaculatum. Halteres
flavi. Alae albae, immaculatae,

PYCNOGONUM. *Haustellum* tubulosum,
conicum absque se-
tis.

Palpi ad basin haustelli.

Ceti.

2. P. corpore ovato, pedibus quarti quintique pa-
ris linearibus muticis.

Cymothoa Ceti Ent. syst. 2. 509. 21.

Oniscus Ceti Linn. syst. Nat. 2. 1060. 6. Fn. Su.
2056.

Martens Spitzb. tab. 8. fig. D.

Degeer Inf. 7. 541. 6. tab. 42. fig. 6. 7.

Seb. Mus. 1. tab. 90. fig. 5.

Pall. Spicil. Zool. 9. 76. tab. 4. fig. 14.

Habitat in Oceani borealis Balaenis.

PEDICULUS. *Haustellum* retractile, re-
curvum.

Antennae subulatae.

Lanii,

15—6. P. abdomine ovato griseo: margine utrin-
que strigis octo nigris.

Habitat in Lanio Collurio Dom. Cuvier.

Corpus medium, ovatum. Caput cordatum,
antice truncatum, obscurum. Thorax an-

tice angustatus, postice obtuse angulatus.
Abdomen ovatum pilis longis, raris, luteis
griseum margine utrinque strigis nigris octo.

20—1. *P. ovatus* albidus abdominis medio nigro, *Pici*.
thorace antice angustato.

Habitat in Pico viridi Dom. Cuvier.

Medius. Caput triangulare: angulo antico acutiusculo, posticis rotundatis. Antennae lineares. Thorax albidus, antice angustatus, postice obtuse angulatus. Abdomen conue-xum, albidum: medio nigro segmentis octo; ultimo integro. Pedes breues, pallidi femoribus ovatis, compressis.

23—4. *P. elongatus* albidus: margine nigro, ca-*Anatis*.
pite lutescente.

Habitat in Anate Boshas Dom. Cuvier.

Corpus medium, elongatum, fere filiforme.

Caput ovatum, obtusum. Thorax cylindricus, utrinque unidentatus. Abdomen segmentis octo: ultimo bifido.

26—7. *P. elongatus* filiformis flavescens: linea *Tantali*.
laterali atra.

Habitat in Tantalo leucocephalo D. Daldorff.

Corpus valde elongatum, pallide testaceum. Caput triangulare, postice latius oculis nigris antennisque longitudine capitis. Abdomen filiforme, planum linea laterali atra.

ACARUS. *Haustellum* vagina cylindrica, bivalui.

Palpi duo longitudine hau-
stelli.

Antennae filiformes.

4—5. *A. subrotundus*, planus ater albo macula-*histris*.
tus maculaque dorsali cyanea biloba.

Habitat in India orientali Dom. Daldorff.

Maior A. hispano. Antennae breues, crassae, compressae, obtusae utrinque fetis duabus elongatis, erectis basi insertis, niueis. Caput sub antennis incrassatum, vesiculosum, flavescens rostro breui, prominulo. Corpus depressum, planum, subrotundum, atrum antice maculis quinque albis 3. 2. et postice utrinque quatuor marginalibus. In medio dorso macula magna cyanea, postice biloba. Pedes octo brunnei, albo annulati.

variegatus. 7—8. A. obouatus niger antice macula triloba alba postice macula biloba ferruginea.

Habitat in Africa Dom. Dumeril.

Statura et magnitudo A. aegyptii. Antennae breues, extrorsum crassiores. Rostrum porrectum, cylindricum, obtusum. Corpus planum, supra nigrum antice macula magna, trifida, pallida et postice macula maiori, biloba, ramum utrinque antice emittente ferruginea. Margo incrassatus, striatus incisuris albis. Pedes brunnei geniculis albis.







